

# Álgebra lineal

## Taller 7

Matrices elementales; determinantes.

Fecha de entrega: 29 de septiembre de 2017

1. De las siguientes matrices calcule el determinante. Determine si las matrices son invertibles. Si lo son, encuentre su matriz inversa y el determinante de la inversa.

$$A = \begin{pmatrix} \pi & 3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. Determine todos los  $x \in \mathbb{R}$  tal que las siguientes matrices son invertibles:

$$A = \begin{pmatrix} x & 2 \\ 1 & x-3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} x & x & 3 \\ 1 & 2 & 6 \\ -2 & 2 & -6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 11-x & 5 & -50 \\ 3 & -x & -15 \\ 2 & 1 & -x-9 \end{pmatrix}.$$

3. Encuentre por lo menos cuatro matrices  $3 \times 3$  cuyo determinante es 18.

4. (a) Calcule el determinante de  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & & 1 & 0 \\ b_1 & b_2 & \dots & \dots & b_{n-1} & b_n \end{pmatrix}.$

- (b) Calcule  $\det B_n$  donde  $B_n$  es la matriz en  $M(n \times n)$  cuyas entradas en la diagonal son 0 y todas las demás entradas son 1, es decir:

$$B_1 = 0, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ etc.}$$

¿Cómo cambia la respuesta si en vez de 0 hay  $x$  en la diagonal?

5. Sea  $A \in M(n \times n)$ .

- (a) Demuestre que  $\langle A\vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, A^t\vec{y} \rangle$  para todo  $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ .  
 (b) Demuestre que  $\langle AA^t\vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0$  para todo  $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ .

1. Sea  $X$  el conjunto de todas las funciones de  $\mathbb{R}$  a  $\mathbb{R}$ . Demuestre que  $X$  con la suma y producto con números en  $\mathbb{R}$  es un espacio vectorial.

De los siguientes subconjuntos de  $X$ , diga si son subespacios de  $X$ .

- (i) Todas las funciones acotadas de  $\mathbb{R}$  a  $\mathbb{R}$ .
- (ii) Todas las funciones constantes.
- (iii) Todas las funciones continuas.
- (iv) Todas las funciones continuas con  $f(3) = 0$ .
- (v) Todas las funciones continuas con  $f(3) = 4$ .
- (vi) Todas las funciones con  $f(3) > 0$ .
- (vii) Todas las funciones pares.
- (viii) Todas las funciones impares.
- (ix) Todos los polinomios.
- (x) Todas las funciones nonegativas.
- (xi) Todos los polinomios de grado  $\geq 4$ .

2. Sean  $m, n \in \mathbb{N}$ . Demuestre que  $M(m \times n, \mathbb{R})$  con la suma y producto con números en  $\mathbb{R}$  es un espacio vectorial.

De los siguientes subconjuntos de  $M(n \times n)$ , diga si son subespacios.

- (i) Todas matrices con  $a_{11} = 0$ .
- (ii) Todas matrices con  $a_{11} = 3$ .
- (iii) Todas matrices con  $a_{12} = \mu a_{11}$  para un  $\mu \in \mathbb{R}$  fijo.
- (iv) Todas matrices cuya primera columna coincide con la última columna.

Para los siguientes literales supongamos que  $n = m$ .

- (v) Todas las matrices simétricas (es decir, todas las matrices  $A$  con  $A^t = A$ ) si  $n = m$ .
- (vi) Todas las matrices que no son simétricas.
- (vii) Todas las matrices antisimétricas (es decir, todas las matrices  $A$  con  $A^t = -A$ ) si  $n = m$ .
- (viii) Todas las matrices diagonales.
- (ix) Todas las matrices triangular superior.
- (x) Todas las matrices triangular inferior.
- (xi) Todas las matrices invertibles.
- (xii) Todas las matrices no invertibles.
- (xiii) Todas las matrices con  $\det A = 1$ .